

Meme ve Aksilla Muayenesi

Bölüm 6

doi: 10.37609/akya.1222.c1028

Dr. Ekmel TEZEL

1. Klinik Topografik Anatomi

Meme; cilt altı dokular arasında yerleşmiş, glandüler ve yağ dokusundan oluşan, sekonder seks karakterlerinden biri olan bir organdır. Kadınlarda süt üretimi (laktasyon) fonksiyonu dışında, kozmetik ve cinsel kimlik açısından da önemlidir.

Meme Tabanı ve Yerleşimi

- Anatomik olarak meme, 2. veya 3. kostadan başlar ve 6. veya 7. kostaya kadar uzanır (Şekil 1).
- Transvers planda, sternumun yan kenarından, ön aksiller çizgiye kadar yayılır.
- Meme ucu genellikle midklaviküler çizgi üzerinde ve 4. interkostal aralık hizasında bulunur.

4A	Düşük düzeyde şüpheli	%2–10 malignite riski
4B	Orta düzeyde şüpheli	%10–50 risk
4C	Yüksek düzeyde şüpheli	%50–95 risk
5	Malignite yüksek olasılık	%95–99 olasılıkla malign
6	Biyopsi ile doğrulanmış	Malignite tanısı konmuş olgu

Kaynaklar

1. Dunphy JE, Botsford TW. Physical examination of the surgical patient. 2e. W.Saunders; 1959.
2. Tezel E. (Editör). Genel Cerrahi Pratik Rehberi. Cerrahide Anamnez ve Muayene Yöntemleri, Akademisyen Yayınevi; 2020.
3. Henderson JA, Duffee D, Ferguson T. Breast Examination Techniques. [Updated 2023 Jan 16]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459179/>